

Una comisión gubernamental irlandesa acusa a 150 religiosos de abusos a menores

AFP, Dublín

Hasta 150 religiosos católicos —sacerdotes y miembros de órdenes— han sido acusados en Irlanda por una comisión gubernamental que investiga los supuestos casos de abusos sexuales a menores cometidos en la diócesis de Dublín entre 1936 y 1999.

De los 150 implicados, 74 son los autores directos de los abusos. Otros 10 es posible que sean acusados del mismo delito, y 61 están implicados por conocer los actos y no actuar, o, directamente, encubrir a los abusadores. Las acciones judiciales que podrían derivarse de la investigación pueden llegar a costar a la diócesis —la mayor del país— 7,8 millones de euros en indemnizaciones para los perjudicados, de los que no se ha facilitado el nombre ni el número.

La investigación comenzó en 2000, y está previsto que las conclusiones definitivas se presenten la semana que viene, dijo ayer un portavoz del grupo gubernamental. Los abusos se cometieron en orfanatos, centros de menores, hospitales y otras instituciones de carácter público pero gestionadas por religiosos.

Este es el segundo gran escándalo por abusos sexuales que sacude Irlanda en menos de dos años. En octubre de 2005 otra investigación destapó otra serie de vejaciones continuas en la diócesis de Fern, en la que estaban implicados 21 sacerdotes. La red de pederastia había actuado impunemente —y con el conocimiento de sus superiores— durante dos décadas entre los sesenta y los ochenta, sin que en ningún momento el obispo responsable actuara.

Los niños obesos comen un 130% más tras ver anuncios de comida

EL PAÍS, Madrid

Los anuncios de comida abren el apetito, sobre todo si los ven niños con problemas para controlar su dieta. Un estudio presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad celebrado en Budapest ha recogido una presentación que muestra que los niños obesos comen hasta un 134% más tras ver este tipo de publicidad en la televisión que un grupo similar que vio anuncios de juguetes u otros objetos.

El efecto es proporcional al peso. Entre los niños que no están ni gordos ni delgados, la ingesta fue un 101% superior que la de sus iguales que habían visto otro tipo de publicidad. Los que menos pesan son más inmunes a la publicidad. La diferencia entre lo que comían los que habían visto anuncios de alimentos y los que no los habían visto fue del 84%.

El estudio fue hecho por psicólogos de la Universidad de Liverpool (Reino Unido). Además de comer más, los obesos elegían los productos anunciados, sobre todo chucherías.

El éxito del trasplante de hígado a personas con VIH es del 90%

La hepatitis C es la primera causa de muerte en enfermos de sida

EMILIO DE BENITO, Madrid

Tener VIH no es un obstáculo para recibir un trasplante de hígado. Ésta es la principal conclusión de un estudio de la Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España (FIPSE), que ha seguido los 97 trasplantes

hecho a personas con el virus que causa el sida. El resultado es que la supervivencia de las personas con VIH trasplantadas y las que no tienen el virus es la misma (un 90% el primer año).


El virus de la hepatitis C (VHC) y el de inmunodeficiencia humana (VIH) se transmiten por vías similares. Por eso no es extraño que gran parte de las personas con uno de ellos tenga también el otro. En total, en España —donde no hay registros de infectados y se calcula que más del 20% de los afectados no está diagnosticado— se calcula que entre 50.000 y 60.000 personas tienen la doble infección.

Hasta hace poco, el VIH era la principal amenaza. Sin medicación, actúa más rápidamente que el virus de la hepatitis. Pero con los nuevos tratamientos implantados a partir de 1996, esta relación se ha invertido: las personas controlan mejor la progresión del VIH, lo que da tiempo a que actúe el VHC.

Órganos escasos

Este virus —que se cura en poco más del 50% de los casos y cuya acción se acelera cuando coexiste con el VIH— acaba produciendo cirrosis o cánceres hepáticos. El resultado es que los problemas de hígado son ya la primera causa de defunción entre las personas con VIH. Para evitar este desenlace, en muchos casos no queda más remedio que realizar un trasplante de hígado. Cada año se realizan aproximadamente 1.000 de éstos. Pero los órganos son escasos, por lo que, antes de generalizar esta práctica había que confirmar

Trasplantes de hígado



que iba a ser efectiva. Esto es lo que ha concluido un estudio patrocinado por FIPSE (una fundación que financian siete laboratorios que fabrican medicamentos antivirales) con sociedades médicas, el Grupo de Estudio sobre Sida en España (Gesida) y organismos oficiales: la supervivencia al año, los dos años y los tres años es la misma en personas que reciben un trasplante de hígado tanto si éstas tienen además VIH como si no. En concreto, las cifras son un 90% de supervivencia en primer año, 74% a los dos y 67,5% a los tres.

Con estos números, las asociaciones de personas con VIH esperan que se acaben los problemas que algunos de los afectados han tenido para recibir un trasplante, ante las dudas de los médicos que tienen que

decidir si usar un hígado en una persona aquejada por otra infección, cuando había posibles receptores sin ese virus. Además, la investigación se ha convertido en una de las más numerosas del mundo (sólo por detrás de EE UU y Francia), y permite establecer los criterios para futuras intervenciones.

Esto no quiere decir que todas las personas con VIH sean receptores idóneos. En el mundo de los trasplantes, donde se busca la máxima eficacia, no es lo mismo tener una infección controlada que sufrir alguna infección oportunista, que pueda suponer un riesgo añadido de fracaso. Estos aspectos son los que habrá que estudiar en el futuro, a partir de los datos obtenidos y el seguimiento de los casos actuales.

El deshielo del Ártico supera las predicciones

EL PAÍS, Madrid

El deshielo del Ártico avanza a un ritmo que deja atrás las predicciones más pesimistas elaboradas por los ordenadores más potentes o los científicos más informados. Así lo demuestran las últimas imágenes captadas por satélite para el Centro Nacional estadounidense de datos sobre Hielo y Nieve (NSIDC en inglés), y lo afirman los autores de un análisis de estas fotografías que publicó ayer la edición digital de *Geophysical Research Letters* (GRL).

El estudio muestra que ni siquiera las recientes predicciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) han acertado, y que la retirada de la capa de agua helada del Ártico hacia el norte es más rápida y más extensa que lo predicho. Los cálculos que se manejaban apuntaban que en septiembre, el mes en el que la capa de hielo del Ártico llega a su mínimo, se iba a reducir un 2,5% en-

tre 1953 y 2006. Los modelos más pesimistas llegaban hasta el 5,4%. Pero estas cifras se han visto superadas por la realidad. Los últimos datos reunidos por satélites, aviones y embarcaciones indican que la retirada de la capa helada fue un 7,8% superior a la de 1963.

“Esta disparidad en los datos indica que la extensión del deshielo en verano se ha adelantado el equivalente a 30 años”, ha dicho el científico del centro sobre la nieve y el hielo, Ted Scambos.

El resultado práctico será que el Ártico se podrá circunnavegar en verano, pasando al norte de las costas de Canadá y Rusia, alrededor de 2050, y no habrá que esperar hasta 2100 como habían predicho los expertos del IPCC.

La causa del error en los cálculos está en una mala interpretación de la influencia de los gases de efecto invernadero en el calentamiento del Ártico. Los expertos calculaban que aproximadamente la mitad de la subida de



Un oso polar en el Ártico. / ASSOCIATED PRESS

temperaturas se debería a las emisiones, y la otra mitad a causas naturales, pero esta proporción se ha alterado y la influencia humana es mayor, dicen los autores del estudio.

El Ártico es especialmente sensible a estos cambios. Al desapa-

China endurece las adopciones para evitar a los solicitantes homosexuales

EFE, Pekín

Los nuevos requisitos exigidos por China para la adopción internacional, que dan prioridad a las parejas heterosexuales casadas, sanas y con un alto nivel de estudios e ingresos, entraron en vigor ayer. El CCA no permite adoptar a homosexuales, a los que considera “personas con desorden mental” y la ley china sólo reconoce el matrimonio entre hombre y mujer. Para alcanzar la “idoneidad”, los solteros aspirantes a padres están obligados a añadir a la documentación una declaración firmada ante notario de que son heterosexuales, paso suficiente para superar el filtro chino.

Las nuevas medidas pueden afectar a futuras solicitudes de españoles, que en 2006 acogieron a 1.800 menores chinos. España, EE UU y Canadá son los países con el mayor número de adopciones en China.

Las nuevas disposiciones, recogidas en el formulario perjudican a solteros, homosexuales, obesos y mayores de 50 años, entre otros. Aunque la Ley General de Adopción (1992) no ha cambiado, el Centro Chino de Adopciones (CCA), institución encargada de su aplicación, impuso nuevos criterios para la idoneidad. “Solamente completa requisitos”, añadió un portavoz oficial.

El director del CCA, Xing Kai-min, explicó que hay menos niños para adoptar y se buscan las mejores familias posibles, proteger los intereses de los huérfanos y acortar el tiempo de espera a los más cualificados. Los solicitantes (siempre un hombre y una mujer, casados y menores de 50 años) deberán contar con un patrimonio superior a 80.000 dólares (58.600 euros) e ingresos que permitan cubrir con al menos 10.000 dólares anuales (7.300 euros) a cada miembro de la familia, incluido el niño a adoptar.

recer el hielo, éste no refleja el calor, con lo que el agua sube de temperatura, lo que, a su vez, acelera el deshielo. Esto produce un círculo vicioso que explica el fallo de los modelos, y que entre 1979 y 2006 se haya acelerado un 9,1% el deshielo.