



Tabla 12.7-2
Criterios diagnósticos DSM-IV para la intoxicación por alucinógenos

- A. Consumo reciente de un alucinógeno
- B. Cambios psicológicos y comportamentales desadaptativos clínicamente significativos (por ejemplo, ansiedad o depresión marcadas, ideas de referencia, miedo a perder el control, ideaciones paranoides, deterioro del juicio o de la actividad social o laboral) que aparecen durante o poco tiempo después del consumo del alucinógeno.
- C. Cambios perceptivos que tienen lugar en un estado de alerta y vigilia totales (por ejemplo, intensificación subjetiva de las percepciones despersonalización, desrealización, ilusiones, alucinaciones, sinestesias) que se aparecen durante o poco tiempo después del consumo de alucinógenos.
- D. Dos (o más) de los siguientes signos que aparecen durante o poco tiempo después del consumo de alucinógenos:
 - 1) Dilatación pupilar
 - 2) Taquicardia
 - 3) Sudoración
 - 4) Palpitaciones
 - 5) Visión borrosa
 - 6) Temblores
 - 7) Incoordinación
- E. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental.

Reproducido con permiso. DSM-IV: *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*. © Masson, S.A., Barcelona, 1995.



Tabla 12.6-3
Criterios diagnósticos DSM-IV para la abstinencia de cocaína

- A. Interrupción (o disminución) del consumo prolongado de abundantes cantidades de cocaína.
- B. Estado de ánimo disfórico y dos (o más) de los siguientes cambios fisiológicos que aparecen pocas horas o días después del Criterio A:
 - 1) Fatiga
 - 2) Sueños vívidos y desagradables
 - 3) Insomnio o hipersomnia
 - 4) Aumento del apetito
 - 5) Retraso o agitación psicomotora
- C. Los síntomas del Criterio B causan un malestar clínicamente significativo o un deterioro de la actividad laboral, social o de otras áreas importantes de la actividad del sujeto.
- D. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental.

Reproducido con permiso. DSM-IV: *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*. © Masson, S.A., Barcelona, 1995.



Tabla 12.7-3
Criterios diagnósticos DSM-IV para el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos (flashbacks)

- A. Reexperimentación, después del cese del consumo de alucinógenos, de uno o más síntomas perceptivos que ya se experimentaron en la intoxicación por el alucinógeno (por ejemplo, alucinaciones geométricas, percepciones falsas de movimiento en los campos visuales periféricos, *flashes* de color, intensificación de los colores, estelas en las imágenes de objetos en movimiento, post-imágenes positivas, halos alrededor de los objetos, macropsia y micropsia).
- B. Los síntomas del Criterio A provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del sujeto.
- C. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica (por ejemplo, lesiones anatómicas e infecciones del cerebro, epilepsias visuales) ni se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (por ejemplo, delirium, demencia, esquizofrenia) o por alucinaciones hipnopómpicas.

Reproducido con permiso. DSM-IV: *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*. © Masson, S.A., Barcelona, 1995.



Tabla 12.10-2
Criterios diagnósticos DSM-IV para la intoxicación por opiáceos

- A. Consumo reciente de un opiáceo.
- B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente significativos (por ejemplo, euforia inicial seguida de apatía, disforia, agitación o inhibición psicomotora, alteración de la capacidad de juicio, o deterioro social o laboral) que aparecen durante o poco tiempo después del consumo de opiáceos.
- C. Miosis (o midriasis por anoxia en la intoxicación grave) y uno (o más) de los siguientes signos, que aparecen durante o poco tiempo después del consumo de opiáceos:
 - 1) Somnolencia o coma
 - 2) Lenguaje farfullante
 - 3) Deterioro de la atención o de la memoria
- D. Los síntomas no son debidos a una enfermedad médica ni se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental.

Especificar si:
Con alteraciones específicas



Tabla 12.10-3
Criterios diagnósticos DSM-IV para la abstinencia de opiáceos

- A. Alguna de las siguientes posibilidades:
 - 1) Interrupción (o disminución) de un consumo abundante y prolongado (varias semanas o más) de opiáceos
 - 2) Administración de un antagonista opiáceo después de un período de consumo de opiáceos
- B. Tres (o más) de los siguientes signos y síntomas, que aparecen de pocos minutos a varios días después del Criterio A:
 - 1) Humor disfórico
 - 2) Náuseas o vómitos
 - 3) Dolores musculares
 - 4) Lagrimeo o rinorrea
 - 5) Dilatación pupilar, piloerección o sudoración
 - 6) Diarrea
 - 7) Bostezos
 - 8) Fiebre
 - 9) Insomnio
- C. Los síntomas del Criterio B provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
- D. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental.