LACTANCIA



Anatomía de la mama

Mª José Alemany
EUE La Fe

LACTANCIA



Mª José Alemany
EUE La Fe

LACTANCIA

Fisiología de la secreción láctea

-**Mamogénesis**: crecimiento y desarrollo mamarios. Se inicia en la pubertad y finaliza en el embarazo por influencia hormonal (prolactina, somatotropina, . Responsable la prolactina segregada por la hipófisis y regulada por la acción de la hormona factor inhibidor de la prolactina (PIF).

-**Lactopoyesis y eyección láctea**: mantenimiento y transporte activo de la secreción láctea. Al finalizar el 1 mes disminuye el nivel basal de prolactina, pero aumenta la secreción de ésta después de cada toma, con lo cual se prepara la leche para la siguiente toma. En el mantenimiento de la secreción interviene tanto el vaciado de la mama como lactógeno placentario y los corticoides).

-**Lactogénesis**: secreción láctea .el reflejo neurohormonal.

Mª José Alemany

EUE La Fe

LACTANCIA

Prácticas de lactancia materna

-Posición de la madre y el neonato

-Succión del neonato

-Frecuencia y duración de las tomas

Incidencias

-Ingurgitación mamaria

-Grietas

- Cuidado de la mama lactante (limpieza de manos, ducha diaria)
- Fármacos y lactancia materna (siempre consultar antes)
- Inhibición de la lactancia
  - Casos: Tuberculosis, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca e infecciones agudas
  - Sujetador que comprima o vendaje y reducción de líquidos
  - Bromoergocriptina

Mª José Alemany

EUE La Fe